

# 当クリニック推奨の小児ワクチン接種スケジュール

2016年06月01日現在

湘南鎌倉バースクリニック

ロタウイルス(RV)は生ワクチンなので次のワクチン接種を受けるには接種後4週以上あけない  
なければならないことと、生命に関わる重篤な感染症を予防するヒブ(Hib)、肺炎球菌(PCV13)、ジフ  
テリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ混合(DPT-IPV)も早期に接種すべきワクチンであること  
から、RVワクチン接種を受ける場合、少なくとも上記3種類のワクチンと一緒に同時接種しなけ  
ればなりません。B型肝炎(HBV)もお勧めのワクチンです。これらのワクチンを含めると、同時接  
種するワクチンは最大5種類(生後3か月時)となります。同時接種について詳しくは、別紙「**同時接  
種Q&A**」(pdfファイル)をお読み下さい。当クリニック推奨のワクチン接種デビュー日は、生後3  
か月0日から4週間前です。

BCGは、生後5か月のDPT-IPV1期初回3回目との同時接種がお勧めです。

日本脳炎(JE)は、生後6か月から受けられます。BCG接種終了後4週以降がお勧めです。3歳未  
満で日本脳炎を発症したという報告が相次いでいるので、厚生省が定めた標準的な接種年齢であ  
る3~4歳になってから接種を受けるのでは遅すぎます。

また、1歳の誕生日を迎えたら、なるべく早く(誕生日当日でもOKです!）、麻疹・風疹混合  
(MR)を受けましょう。おたふくかぜ(M)、水ぼうそう(V)との同時接種がお勧めです。M、Vは免  
疫がつきにくいので、3か月以上あけてもう1回接種がお勧めです。

下の表の接種スケジュールから外れてしまっても心配ありません。立て直し方はいろいろあり  
ます。お気軽にご相談ください。

年齢	RV	HBV	Hib	PCV13	DPT-IPV 1期	JE 1期	BCG	MR	M V
種類	経口生	不活化	不活化	不活化	不活化	不活化	経皮生	生	生
2か月	1	1	1	1					
3か月	2	2	2	2	初回1				
4か月			3	3	初回2				
5か月					初回3		○		
6か月						初回1			
7か月		3				初回2			
11か月			4		追加				
12か月				4				1期	1
15か月									2
19か月						追加			
4歳以降					IPVのみ			2期	